



Этот больной _____ страдает из идиопатической тромбоцитопенической пурпуры - ИТП. Больной может иметь проблемы с кровоизлиянием после повреждения. В очень разжиженных наблюдениях, самопроизвольное внутреннее кровоизлияние может проявляться.

Никогда не давать больному аспирин или медицину содержащую аспирин. Парацетамол может быть дан.

ИТП не является инфекционной болезнью.

Что такое ИТП?

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура представляет собой кровяное нарушение причем иммунная система туловища разрушает тромбоциты в крови. Тромбоциты необходимый фактор в кровяном механизме свертывания.

ИТП ассоциируется с ниже-приведенными симптомами: Неспособность предотвратить кровоизлияние после повреждения; крупный многоцветный ушиб (часто без клинической причины); многочисленные малые красноватые-коричневые кровоподтеки; частый кровотечение из носа или из рта; необычно тяжелые месячные; петехии - сыпь красной булавки-игла споты на коже из-за просачивающихся капилляров.

Большинство больных не чувствуют себя нездоровыми, несмотря на их склонность кровоточить.

Лечение

Основными лечениями для детей являются стероиды и гаммаглобулинопрофилактика. Если ребенок для кого назначены стероиды заражается ветряной оспой, надо сразу обратиться к врачу. Для взрослых, лечения включают стероиды, гаммаглобулинопрофилактика и иммунодепрессивная терапия. Возможно тоже удаление селезенки.

Иньекции и Вакцинация

Внутримышечные инъекции всех видов должны быть избегнуты, но подкожные и внутривенные вливания допустимые.

Для лиц которые получают большие дозы стероидов или в течение последних трех месяцев получили иммунодепрессивную терапию, живая вакцина дает риск диссеминированного заражения и убитая вакцина может быть неэффективна.

Первая помощь

Чтобы прекратить кровотечение из носа, надо прищемлять нос между костью и ноздрями с ровным нежным давлением. После пяти минут удалите давление и содержите больного спокойно еще пять минут. Лед в пузыре также полезный для остановления кровотечения.

Ищите медицинскую помощь для любого кровоизлияния которое не может быть остановлено, для любых отеков повреждений (например, напряжения), или если имеется любой признак заражения или лихорадки, особенно у больных без селезенки или прошедших курс стероидов.

В любой травме требующей медицинского лечения, важно что медицинский персонал проинформирован что больной страдает из ИТП. Покажите им эту листовку.

Кровоизлияние в мозг крайне разжиженное, но симптомы обычно явные - интенсивная головная боль, сонливость приводящий к потере сознания, рвота и слабость половины тела. Ищите скорую медицинскую помощь и сканирование мозг.

Подробности Больного

Известные болезни и заболевания _____

Известные амергии _____

Больной проходит курс лечения _____

Экстренный контакт _____

Адрес _____

Телефон _____